Mączniak rzekomy kapustowatych (Peronospora parasitica)

Liścienie – na dolnej stronie blaszki delikatny, szarobiały nalot struktur patogena; porażone liścienie stopniowo żółkną i zamierają.

Liście – na górnej stronie blaszki liściowej żółte plamy z brunatną, nieregularną obwódką; na dolnej stronie w tym samym miejscu delikatny, szarobiały nalot struktur patogena; porażone liście, podobnie jak liścienie, żółkną oraz zamierają.

Z – zaprawianie nasion

Szkodliwość

Chore liścienie i liście mają utrudnione procesy asymilacji i są źródłem infekcji innych organów. Silnie porażone siewki zamierają, co prowadzi do przerzedzenia plantacji, natomiast pojawienie się choroby w późniejszym okresie rozwoju roślin najczęściej nie ma większego znaczenia. Na pojawienie się sprawcy mączniaka rzekomego mają wpływ nadmierna i przedłużająca się wilgotność, zbyt gęsty i głęboki siew oraz brak zrównoważonego nawożenia.



RAPOOL-RING GmbH
Eisenstr. 12
D-30916 Isernhagen HB

Telefon: +49 (0)511 72666-0
Service Telefon : 0800-72666 00
Telefax: +49 (0)511 72666-100

E-Mail: rapool@rapool.pl
Internet: www.rapool.pl
© 2024 RAPOOL-RING GmbH