Czerń krzyżowych (Alternaria brassicae)

Siewka – przewężenia szyjki korzeniowej lub brunatne, owalne nekrozy na liścieniach, częste obumarcie roślin lub osłabienie (zgorzel siewek).

Liście – żółkną, czerwienieją, więdną, następuje zahamowanie wzrostu (objawy niespecyficzne).

Łodyga – zahamowanie wzrostu, przyspieszone pąkowanie i kwitnienie, więdnięcie (objawy niespecyficzne).

Łuszczyna – podłużne lub owalne, brunatne lub czarne, zagłębione plamy; w przypadku dużego nasilenia choroby łuszczyny przedwcześnie zasychają i pękają.

Szkodliwość

Porażone siewki zamierają, co powoduje przerzedzenie plantacji. Zainfekowane liście mają utrudnione procesy asymilacji, są też źródłem choroby dla innych liści czy łuszczyn. Porażenie łuszczyn prowadzi do ich przedwczesnego pękania i osypywania się nasion. Nasiona z porażonych łuszczyn są drobne, gorszej jakości i zasiedlone przez grzyby, obniża się także ich wartość jako materiału siewnego.



RAPOOL-RING GmbH
Eisenstr. 12
D-30916 Isernhagen HB

Telefon: +49 (0)511 72666-0
Service Telefon : 0800-72666 00
Telefax: +49 (0)511 72666-100

E-Mail: rapool@rapool.pl
Internet: www.rapool.pl
© 2024 RAPOOL-RING GmbH