

Chowacz czterozębny (Ceutorhynchus quadridens Panz.)

Jajo – długości 0,5 mm, owalne, białe.

Larwa (stadium szkodliwe) – długości 4–5 mm, biała z ciemnobrązową głową, ciało zakrzywione, bez odnóży.

Poczwarka – długości do 4 mm, biała.

Osobnik dorosły – chrząszcz osiąga wielkość 2,5–3 mm. Jego czarne lub niebieskoczarne z szarzielonym odcieniem ciało pokrywają rdzawe, krótkie włoski. Odnóży mają barwę od czerwonożółtej aż po rdzawobrazową, stopy są ciemnobrunatne. Na zetknięciu pokryw skrzydeł przy przedpleczu widnieje jaśniejsza plamka. Głowa jest zakończona cienkim i długim, wygiętym ku dołowi ryjkiem, u samców owłosionym natomiast u samic włoski występują tylko w jego części nasadowej.

Szkodliwość

Osobniki dorosłe uszkadzają ogonki liściowe, jednak nie powodują większych strat. Natomiast larwy rozwijające się w nerwach głównych liści, ogonkach liściowych i łodygach, wygryzając chodniki niejednokrotnie aż do szypki korzeniowej, mogą być zagrożeniem gospodarczym. Początkowo objawy żerowania larw nie są widoczne, dopiero z czasem wraz z powiększającymi się uszkodzeniami liście żółkną i zaginają się ku dołowi. Po przekrojeniu pędu widoczne są wygryzione chodniki ciemnej barwy. Przy dużych uszkodzeniach może nastąpić zahamowanie wzrostu, a także wylegania uszkodzonych roślin na wietrze.