

Rolnice (Agrotinae)

Jajo – półkoliste, o żeberkowanej powierzchni, długości ok. 0,6 mm. Początkowo jasne mlecznobiałe, z czasem ciemnieje i staje się czerwone.

Gąsienica (stadium szkodliwe) – dorasta do 50–60 mm. Początkowo jest żółtozielona, po kolejnych linieniach zmienia barwę na oliwkowoszara z silnym woskowym połyskiem. Ma miękkie, delikatne ciało i twardą głowę, trzy pary odnóży tułowiowych oraz pięć par odwłokowych. Zaniepokojona zwija się spiralnie. Na jej ciele widnieją czarne punkty lub ciemne smugi.

Poczwarka – typu zamkniętego, ciemnobrązowa lub bordowa, wielkości 20–25 mm.

Osobniki dorosłe i larwy (stadium szkodliwe) – motyle barwy jasno- lub ciemnobrązowej. Na przednich skrzydłach widnieją okrągłe lub przecinkowate plamki, na ogół trzy na każdym skrzydle. Druga para skrzydeł jest zdecydowanie jaśniejsza, zazwyczaj nie widać jej podczas spoczynku motyli. Rozpiętość skrzydeł nie przekracza 55 mm. Ciało owłosione długości 30 mm. Samce mają grzebieniaste czułki i są nieco jaśniejsze od samic.

Miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Występowanie na rzepaku												
Zwalczanie chemiczne												

Szkodliwość

Największe uszkodzenia powstają bezpośrednio na początku wegetacji roślin. Gąsienice mogą wyjadać kiełkujące nasiona oraz siewki rzepaku jarego i ozimego, często podgryzają rośliny przy szyjce korzeniowej. Tak uszkodzone rośliny przewracają się i zamierają lub gąsienice wciągają je do korytarzy w glebie i zjadają. W miejscu żerowania powstają puste place.